

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十三

詳校官太醫院恩程臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆璘

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣王爾熙

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十三 明

周王朱橚 撰

嬰孩癖積腹滿門

宿食不消

附論

夫小兒腸胃嫩弱飲食易傷若將養失宜乳哺不節致脾胃不能傳化水穀之氣故令乳食宿夕停滯不消其候腹滿壯熱眠寢不安診其三部脉俱沉滑者乳不消也經云以胃氣為根本而以飲食為命脾為中州乃

土也胃受土之氣滋味萬物玄機曰食入胃而脾為磨
化布五味以養五臟榮養百骸潤澤四肢固其根本也
巢氏曰胃氣調和則乳哺消化脾胃虛冷則宿食不消
楊氏曰驚惕不食者心為脾母火能生土當用心藥入
脾胃藥中母能令子實古人進食方用益智等者此也
小兒宿食不消身體發熱或發吐瀉宜用水精丹利
之却下補藥調理如身上熱不退瀉不止仍發渴心躁
宜進玉珍散二三服如更不退須進銀澁散三服却將

調胃氣藥相間服若只瀉清水宜用白龍丸一二服錢氏論食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

方

金箔丸治小兒驚風妳食不化或外受風傷冷毒瀉血一切諸疾悉治之

金箔

四十片

硃砂

水銀

牛黃

青黛

各研

白僵蠶

微炒 蟬殼

麻黃

白附子

天麻

麝香

研

犀角

末

乾蠍

天南星

一錢

右修事畢入乳鉢內研令勻細用生蜜和為錠子以
油單子裹每服二九桐子大薄荷湯化下傷寒用生
薑薄荷湯化下小兒諸疾無不效

胡黃連九治小兒驚疳化涎消食

胡黃連 牛黃 硃砂 麝香少許 蘆薈 青黛

鈎藤 管仲 膩粉少許 鶴虱各等分

右為末麪糊為丸如粟米大每服三九至五九如有
驚食只取下食如無不動

牛黃鼈甲丸治少小癖食壯熱食不消化中惡忤氣並

宜治之

方見本門

代赭丸治小兒驚熱腹脹宿食不消積年瘦弱

代赭石

一兩

丹砂

別研

麝香

別研

犀角

一分

大黃

牛黃

各三

分當歸

鼈甲

巴豆

別研

枳殼

各半兩

右搗羅九味為散入巴豆再研勻煉蜜和搗一二百

杵丸如麻子大二三歲兒空腹熟水下四五歲已上

量大小加之

丁香丸治小兒宿食不消心腹虛脹

丁香 水香

乳香

研細

雄黃

研細

青橘皮

各一分

肉豆蔻

去殼

檳榔

各二兩

巴豆霜

半

硫黃

錢一

硃砂

半

兩

右為末研令勻煉蜜和丸如黍米大每服以粥飲下
三九量兒大小加減服之

九味當歸湯療小兒宿食不消發熱

當歸 甘草 芍藥 人參 桂心 黃芩 乾

薑

各一分

大棗

五枚

大黃

二分

真珠丸治小兒驚熱化聚滯妳食墜涎利攻腸

真珠

細研

天竺黃

為細末

硃砂

各一分

丁頭代赭

雄黃

各半
研麝香

各半

杏仁

三十粒

巴豆

十粒

去皮

右為細末研令勻煉蜜為丸如菉豆大每服以生薑湯下一丸三歲以上加減服之

快膈消食丸

又名消乳丸

縮砂仁 橘皮 荊三稜 蓬莪茂 神麴 麥

藥

已上各半兩

香附子

甘草

炙各一兩

右為末麪糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減
一方無甘草

三稜丹調冷熱消宿食

荆三稜 神麪

木香

各一兩

乾薑

半兩半夏

一兩生薑汁製

丁香

陳橘皮

去白

桂心

各半兩

右為末煉蜜丸鷄頭大每服一粒薑湯化下

消穀丸治小兒宿食不消體熱多眠嘔噦氣上

陳麪

木香

人參

乾薑

麝香

甘草

枳

殼麩炒
微黃

右各等分搗研為末煉蜜丸如黃米大每服二十九
溫米飲下

犀角丸治小兒宿食不消心腹脹滿止痰逆利胸膈進
乳食

犀角 青橘皮 荊三稜 木香
各半 黑牽牛炒

兩
巴豆去心 皂莢三
半錢 挺

右六味與巴豆研勻麪糊丸如麻子大每服七丸至

十九食後生薑橘皮湯下量兒大小加減

平胃丸治丈夫小兒食實不消胃氣不調或溫壯熱結
大小便不利者有病冷者露宿丸熱藥後當進此丸
調胃

大黃

二兩

小草

甘草

芩窮

葶藶

各一兩

芍藥

一兩

杏仁

五十箇

右為末蜜丸如桐子大每服五九日三服一歲兒二
九漸加之千金翼有菖蒲當歸乾薑茯苓麥門冬細

辛無杏仁為十二味

訶梨勒散治小兒宿食不消化少飲食四肢消瘦腹脇

多脹

訶梨勒皮

分三

白朮

麥蘖

炒

陳橘皮

檳榔

各半兩

甘草

分一

人參

兩半

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓量兒大小分減溫服日進四五服

代赭丸治小兒宿食不消壯熱腹脹

代赭

研細

當歸

炒

硃砂

研細

枳殼

炒

木香

各半

麝香

一兩

巴豆霜

半兩

右搗為末入研藥更研令勻煉蜜丸如麻子大每服以粥飲下二九更量兒大小以意加減

黃芩散治少小腹大短氣進食不安穀為之不化

黃芩

大黃

甘草

麥門冬

芒硝

各二兩

石膏

一兩

桂心

八銖

右切以水三升煎取一升分為三服一歲以上為五

服

麝香安中丸治小兒飲食不化寬中止吐

甘松葉

三兩

益智

香皮

香附子

各三兩

蓬茂

一兩南

木香

半兩

麝香

一錢

右除麝別研外餘藥同為末白麪糊為丸更用生熟油少許一處和劑量兒大小丸如黍米大每服二十丸至三十九薑湯下不計時候

木香丸治小兒氣弱開胃進食

木香 人參 白茯苓 青皮 陳皮 肉豆

各去瓢

寇

已上各一分

右為末麪糊丸如麻子大每服十九薑湯下

七味進食丸常服能進飲食

方見本門

三稜散疎脾土消食化積

三稜

炮

莪朮

益智仁

甘草

神麪

麥蘖

橘紅

各五分

右為末白湯下

香朴散治小兒脾胃氣弱乳食遲化宿昔成積久而不消兼和氣止瀉及腹肋刺痛起止痛不思飲食

厚朴

一兩

木香

麥蘖

陳皮

青橘皮

各一分

右為細散每服半錢湯調下

陳橘皮散治小兒宿食不消心腹脹悶亦治嘔逆惡心背寒脚冷

陳橘皮

高良薑

人參

檳榔

各一分

白茯苓

甘草

炙各半兩

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許
棗一枚煎至五分去滓不計時候量兒大小分減溫
服

檳榔丸治小兒宿食不化發熱有時

檳榔

牽牛子

川大黃

各半兩

乾薑

炮

枳殼

去瓢甘

草

各一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每日空心溫水下五丸
晚後再服更看兒大小臨時增減服之

人參丸

一名參
朮丸

治小兒宿食不消吐痰涎亦治逆食及

乾嘔食少

人參

丁香

乾薑

白朮

陳橘皮

各一分

半夏

半兩

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以溫水下五九日
三服量兒大小以意加減

編銀丸

歌曰壯熱時時又作寒都緣食積未能安早

求良藥須清肺免得兒啼心欲酸白朮陳皮同桔梗

巴霜和蜜去頑涎水銀磨入生犀服銀箔為衣病永痊

白朮

桔梗

橘皮

各一兩

銀箔

三片

水銀

一錢

犀角

一錢

巴豆

二粒

右為末蜜丸如小豆大捻令褊薄荷湯研下一丸

玉珍散治小兒乳食不消頸腫舌青驚躁渴瀉驚熱驚疳

滑石

白者

石膏

半兩

甘草

白附子

白殭蠶

已上各一分

蚌粉

水淘火
上焙乾

右為末入腦麝各少許每服嬰孩一字二三歲半錢
五七歲一錢麥門冬熟水下如渴瀉烏梅湯調下驚
疳燈心湯調下小兒氣怯者腦麝須要極少

千金丸治小兒食不消

木香

烏梅

肉桂

各一兩

硃砂

半錢

胡椒

半分

巴豆

十三粒

粒

右為細末稀糊為丸芥子大每服十九紫蘇湯下

揆積丸治小兒脾胃不和宿食不化腹脹腸鳴嘔逆惡
心便利不調乳食減少或疳瀉大便酸臭亦治丈夫
胸膈不快酒積食積嘔逆惡心吐瀉脾痛

荊三稜

丁皮

各三兩

丁香

青皮

各一兩

乾薑

巴

豆

各半兩

右為細末入巴豆拌勻麪醋糊為丸如粟米大每服
可五丸加至六丸二歲兒可服七丸至十九生薑湯
吞下熱水亦得不拘時候更量兒歲數加減與之此

藥不用大黃礪砂汞粉之類並是溫性之藥常服清
積滯進乳食退黃令兒長肌肉

芍藥丸治小兒不生肌膚腹大食不消化

芍藥

大黃

一兩一分桂皮去粗

赤茯苓

三分柴胡一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如麻子大五六歲空
腹米飲下三九晚再服量兒大小加減

人參湯治小兒胃氣虛宿食不消吐利

人參

赤茯苓

白朮

各半兩

甘草

一分半夏

半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞生薑二片煎至五分去滓溫服不計時候日三服量兒大小加減

牛黃丸

牛黃

附子

三枚

真珠

巴豆

去皮

杏仁

各一兩

右五味搗附子真珠為末下篩別搗巴豆杏仁令如泥內藥及牛黃搗一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米大一丸三歲兒服如麻子大一丸五六歲兒服如胡豆大一丸日二服先乳哺了服

之膈上下悉當微轉藥丸全出者病愈散出者更服以藥丸全出為度

青木香丸治大人小兒寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎塞腹脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

木香

二十兩

補骨脂

十兩

黑牽牛

二十四兩研

葷澄茄

四十箇

檳榔

四十兩

右為細末入牽牛末勻漸入清水和令勻丸如菉豆

大每服二十九茶湯熟水任下食後服每酒食後可服五九七九小兒一歲服一九懷妊人不可服進食九安和脾胃消化積滯止嘔噦吐利除心腹脹滿利胸膈散滿痞常服

丁香

錢一

豆蔻

二箇

木香

半錢

巴豆

九箇

五靈脂

七錢

右為細末麪糊為丸如菉豆大每一二錢食後生薑湯下桃葉湯下亦得一方用陳皮湯下

磨積丸治小兒臟腑怯弱內受積冷脇肋脹痛嘔吐痰

逆腸鳴泄瀉日夜頻併四肢困倦面無顏色肌肉消
瘦不進飲食及疳氣羸瘦肚大青筋口乾煩渴小便
白濁食不生肌或發虛腫寒熱往來或因食甘肥蟲
動作痛叫哭合眼並能治之

乾漆

炒

丁香

各一兩

青皮

去白

荊三稜

各六兩

蓬朮

半斤

右為細末水糊為丸如粟米大每一二歲可服五丸
淡薑湯吞下不拘時候更量歲數虛實加減與之

順氣丸治小兒乳食不化腹急氣逆

巴豆

十粒

胡椒

二十粒

丁香

二十粒

青橘皮

二十枚全青湯浸去白

右用米醋一升煮候醋盡出焙乾為末爛飯九如粟

米大每服二九米飲下更量兒大小加減

延年草安神導虛消酒食益脾老人小兒皆可服

青皮

一斤湯浸三日又三換

甘草

六兩

上等白鹽花

五兩再淋

新缸

上茴香

四兩

右用甜水同藥入金鍋銀鍋亦得不住手攪勿令着

底置密器中收不得走氣候水盡慢火燒令乾不得

有焦氣選謹慎者一人專主之去甘草茴香不用只收貯青皮如傷生冷果實菜蔬之類即嚼數片隨即無恙常服一兩片極佳

白芷九治小兒常服消乳食

白芷

半兩

檳榔

一箇

青橘皮

一分

巴豆

四粒

炮

右為末同研麪糊為丸如粟米大溫水下三九至五

九常服

三味紫霜九治小兒乳食不消

方見本門

五靈脂九治小兒宿食不消心腹脹悶

五靈脂

代赭

各一兩

巴豆霜

各一兩

右為末入巴豆霜同研令勻用麪糊和丸如粟米大
每一歲以溫水下一丸加至三丸

洗心散治小兒妳食傷心作壯熱喘息不調欬逆多睡

甘草

錢一

麥門冬

錢一

皂角

半兩入糖

右爛杵羅為末每服二錢水一盞煎至八分作五服

時時吃

肉豆蔻散治小兒宿食不消

肉豆蔻

二枚

川大黃

一分對

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三服更隨兒大小以意加減

鷄子湯治小兒食不消腹滿不利

鷄子

五箇

亂髮

鷄子大梳去垢

右取煮鷄子汁淋髮上及熱數按之令汁出取服量兒大小與之無毒得下妙

白龍丸治嬰孩乳食不消瀉不止

白龍骨 白石脂

各一分

右為末滴水丸如菉豆大每服三九紫蘇木瓜湯吞
下一日三服量兒大小加減

又方治小兒腹中脹悶疳氣傷食急吐瀉痢不能轉動

青州棗

一箇

巴豆

一粒

右巴豆安棗內慢火炙令焦黑乳鉢細研入麝少許
用飯為丸如麻子大一歲一九如傷食用熱米飲下

如瀉用冷熟水下忌生冷油膩熱物

銀錠散治嬰孩乳食不消發渴心躁

用粉霜不拘多少入乳鉢研令極細每服嬰孩一字

四五歲以下半錢煎蓮花湯下冬月以蓮肉煎湯下

木香化滯丸治小兒宿食不消心腹滿脹嘔吐壯熱

木香 荊三稜

青橘皮

各一兩

補骨脂

二兩

黑牽牛

四兩

右為末滴水丸如黃米大每服三十丸溫水下不

拘時候

紫霜丸治乳食宿滯不化胸膈不利嘔吐惡心便利不調大便酸臭重傷乳食或作諸痢

代赭

醋煨碎

赤石脂

各一兩

杏仁

十粒

巴霜

一錢淨巴豆取仁二錢

右除杏仁巴霜外為末却入杏仁研勻水浸蒸餅丸黃米大每五七丸溫米飲下

發痛湯治小兒痛病皆由乳食不勻不能消化而成

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 藿香 川芎 白

芷 甘草

各等分

右為散每二錢生薑二片棗一箇食前漸漸與之
三稜煎丸治小兒食飲過多痞悶疼痛宿食不化久而
成癖此藥專能治婦人血積血滯

廣茂

黑角者

荆三稜

二味各一兩

大黃

八兩

右將大黃為末於銀器內醋炒或漬令乾用慢火熬
同入二味為丸如麻子大或菜豆大每服十九至二
十九食後溫水送下虛人加減大人如桐子大每服

四十九

廣茂化癖丸治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗吐逆痰涎腸鳴泄瀉米穀完出下痢赤白腹腫後重及食癥乳癖瘕氣痞氣並皆治之

代赭石

兩半

當歸

硃砂

枳殼

廣茂

各半兩

木香

麝香

巴豆霜

荊三稜

各一兩

右為末研藥勻麪糊為丸如麻子大每一歲服二丸溫米飲下更看虛實加減服之食後服

荊蓬朮丸治小兒一切所傷乳食不化心腹脹滿並宜服之常服和胃氣進乳食久服甚有功益

荊三稜 廣茂 陳皮 香附子 蘿蔔子

各半兩

青皮 枳殼 縮砂仁 胡黃連 蘆薈

各三錢

胡

椒

二錢半

右為細末煮麪糊為丸如黃米大每服三十九加至四五十丸溫米飲下三四歲麻子大日進二三服忌生硬冷物

腹脹 附論

夫小兒腹脹者是冷氣結於臟腑故也小兒臟腑軟弱有風邪冷氣客之搏於臟腑則令腹脹若胃虛冷移入於胃食則不消若腸虛冷氣乘之則變下痢也

方

鼈甲散療小兒肚脹漸瘦不食四肢熱不調

甘草 鼈甲 柴胡 茯神 子芩

各六兩

訶梨勒

分 檳榔 芍藥 橘皮

各三分

生薑

當歸

各四分

知

母

五

分大黃

八

右切以水一升半煎為七合為散服得瀉病瘥

茯苓湯

聖濟總錄

治小兒腹虛脹脾氣不調

赤茯苓

犀角

赤石脂

黃連

龍骨

厚朴

去粗皮

陳橘皮

人參

乾薑

各一兩

桂

去粗皮

甘草

各二兩

兩

右為粗末搗篩五六歲每服一錢水一盞煎至四分去滓溫服量大小加減一方去龍骨加麥門冬一兩

調中丸

本事方

治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑 橘紅 白朮 茯苓 木香 縮砂仁

官桂 良薑

各等分

右為細末糊丸如麻子大每服二十九食後熟水下

訶梨勒丸

聖惠方

治小兒脾虛腹脹不能乳食

訶梨勒皮 半兩 木香 人參 白朮 乾薑 甘草

各一分 厚朴 陳橘皮 各半兩

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日

三四服量兒大小加減

調中九治小兒發渴寒熱心腹脹滿

方見本門

木香散

聖惠方

治小兒心腹虛脹

木香

川大黃

麝香

各一分

桑根白皮

陳橘皮

益智子

去皮

草豆蔻

半兩

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞生薑少許煎

至五分去滓不計時候量兒大小分減服之

赤茯苓散

聖惠方

治小兒心腹氣壅脹滿虛熱不能乳食

大小腸氣滯

赤茯苓 木通 人參 甘草 當歸 已上各一分 川

大黃

半兩 枳實 一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小以意加減

白朮湯治小兒腹脹虛熱不能食

白朮 人參 甘草 枳殼 當歸 各一分 牡蠣 半兩

右粗搗篩一二錢每一錢水七分煎至四分去滓分

二服量兒大小加減

消氣丸

聖濟總錄

治小兒腹脹

續隨子

胡椒

各五粒

丁香

二十枚

木香

錢一

蠟梢

四十枚

阿魏

一字

右為末入研藥令勻燒粟米飯丸如麻子大淡醋湯下五丸至七丸

黃連飲

聖濟總錄

治小兒腹脹冷氣結塊痛

黃連

炒一兩

人參

黃芩

當歸

桂

去粗皮

良薑

各半

兩

右剉細如麻豆大每一錢以水七分煎取四分去滓

溫服

木香散

聖惠方

治小兒癖脾胃虛冷腹脇脹滿四肢不和

飲食減少

丁香 桂心 人參 白朮

各一分

陳橘皮

去白

厚朴

去粗皮

各半兩

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許

棗一枚煎至五分去滓溫服三四服更量兒大小加減服之

鼈甲散

聖惠方

治小兒心腹氣壅脹滿虛熱不能乳食大

小腸氣滯

鼈甲

赤茯苓

青橘皮

去白

枳殼

各一分

川大黃

剉

川朴硝

各半兩

右粗搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小以意加減

橘紅丸

聖濟總錄

治小兒胃虛腹脹硬大

陳橘皮

兩半

胡椒

黑牽牛

各一百粒

木香

分巴豆二十粒

右除巴豆外為細末用葱白汁丸如菉豆大每服三九至五九萊菔湯下乳食後臨卧服更量兒大小加

減

縮砂散

聖濟總錄

治小兒腹脹手足漸細精神昏憤不欲飲

食

縮砂仁

木香

丁香

各一兩

膩粉

一分

牽牛

一兩

右搗羅為散每服一字酒調下

導氣九治小兒腹脹氣粗不食一方用胡粉鹽同炒黃
摩兒腹消脹急

荆三稜 青皮 蘿蔔子 皂角 黑牽牛

右等分為末糊九如小豆大三歲三十九米湯下

桂枝橘皮湯

千金方

療少小五六日不食氣逆脹滿

桂心 橘皮 薤白 黍米 人參

各等分

右切以水七升先煮藥取二升次下薤米熟湯成稍

稍服

豆蔻散

聖濟總錄

治小兒虛腹脹

肉豆蔻

一枝

青橘皮

兩半

木香

一分

陳粟米

一合

右將陳粟米同巴豆三七枚炒巴豆每枚刺作竅子

候色焦了巴豆不用將粟米并合藥細末每服半錢

生薑湯下更量兒大小加減

欬氣丸

聖濟總錄

治小兒腹脹硬大

巴豆

十五枚

丁香

一分

麝香

半錢

右為細末麪糊為丸粟米大每服三九煎萊菔湯下
乳食後服更量兒大小加減

消肚丸治小兒疳氣腹脹喘粗或腸鳴洩瀉

乾薑

木香

各一兩

巴豆

七七粒

肉豆蔻

半兩

右為末醋糊丸如小豆大三歲三十九米湯下食前
如常服消肚急木香止用一分去肉豆蔻

地黃飲子療小兒心腹滿吃食不下

生地黃汁

生薑汁

各三分

訶梨勒

四兩

白蜜

一匙

右相和調勻分溫服之微利尤良

前胡散

聖惠方

治小兒心腹氣脹胸膈煩滿

前胡

半兩

丁香

甘草

炙

人參

各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小以意加減

又方治小兒腸內氣壅脹滿不下乳食

聖惠方

川大黃

半兩

木香

青橘皮

去白

檳榔

各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去

滓不計時候溫服以利為效量兒大小以意加減

人參湯

聖惠方

治小兒心腹脹滿利下乾嘔不止

人參

陳橘皮

各一分

甘草

炙半兩

右粗搗篩五六歲每服一錢生薑二片煎至四分去滓溫服日再服更量兒大小加減

通氣散

聖濟總錄

治小兒腹脹

青橘皮

去白

木香

檳榔

各一分

右細剉用巴豆三十粒同炒令赤色為度不用巴豆

只搗三味為細散每服半錢煎紫蘇木瓜湯調下更
量兒大小加減

胡椒丸

聖濟總錄

治小兒腹脹

胡椒 蠟梢 甘遂

右等分為末用燒飯丸如黍米大每服二九陳米飲
下乳食前服并理脾積氣更量兒大小加減

欬氣湯治小兒心腹氣脹喘粗不食及疳氣食積

牽牛子

一兩半

馬兜鈴

一兩

木香

半兩

右搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服日三服三四歲漸加至二錢

消脹丸

全嬰方

治小兒腹脹急并心下滿

半夏

枳殼

各半兩

巴豆

二七粒

右為末糊丸如小豆大三歲三十九陳皮湯下

褐九子

百一選方

治小兒傷食腹脹

蘿蔔子

炒

蓬莪朮

各一兩

胡椒

半兩

右為末麪糊為丸如黃米大不拘時候蘿蔔湯下每

服十五丸至二十丸

檳榔散

聖惠方

治小兒氣不和心腹脹滿不飲食

檳榔

厚朴

各半兩

丁香

一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小以意加減

枳殼散

全嬰方

治小兒疳氣腹脹喘急

枳殼

一兩 巴豆

二十粒

右為末三歲半錢沙糖湯下或作丸子白糊丸如小

豆大三十九桑皮湯下

枳殼丸

全嬰方

治嬰兒百日腹脹氣粗心下滿急此藥多

效并治腹脹咳嗽

半夏

泡七次

枳殼

炒

右為末薑汁丸如小豆大小兒二十九皂子橘皮湯下小者芥子大又千金方治暴腹滿欲死半夏泡為末酒為丸小豆大一歲一十九白湯送下

分氣丸

永類鈴方

治小兒疳氣腹脹膨脝不食

木香

炮一分

黑牽牛

生半兩

右為末麵糊九小豆大三歲三十九米湯下

治小兒黃瘦腹脹

神效方

乾鷄糞

一兩

丁香

一錢

右為末蒸餅為丸如小豆大每服二十九米飲送下

治少小腹脹滿

千金方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方

千金方

以韭根汁和猪脂煎細細服之

又方

千金方

用車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方

千金方

治小兒腹脹并治嬰兒腹皮青若不急治須

臾即死

用米粉鹽等分炒變色腹上摩之

半夏丸

千金方

治小兒腹脹滿欲死

用半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每服二九薑

湯下不瘥加之日再服又方以火炮之為末貼臍下
佳又炮熟切酒服如米粒大五塊

治小兒腹肚脹滿不可忍者

試效濟世方

用晚桑葉不計多少濃煎淋洗乘熱時先薰下部候

通手淋洗

厚朴丸

試效方

治小兒失乳以食飼之未有食腸不能尅

化或生腹脹四肢瘦弱或痢色無常

橘皮 半夏 蒼朮 人參

各三分

厚朴

二分 青皮二分

大麥蘖 枳實 麴末

各半錢

右為細末麴糊為丸如麻子大服二十九溫水送下

食前忌飽食

茯苓滲濕湯

試效方

治小兒面色萎黃腹膜脹食不下

麻黃 桂枝 草豆蔻 厚朴 麴末 羌活

吳茱萸 蒼朮 澤瀉 茯苓 猪苓 橘紅

黃蘗

各二分

杏仁

二箇

柴胡

白朮

各半兩

青皮

黃連

各半兩 升麻

一分

右都作一服水一大盞煎去七分去滓食前溫服

升陽益血湯

試效方

時仲春一小兒未滿百日病腹脹二

日大便一度瘦弱遍身黃色宜升陽氣滋和血補潤

腸胃乾燥也

蠍梢

二分

麴米

升麻

各三分

厚朴

當歸

桃仁

各一錢

都作一服水一盞煎至半盞去滓食前稍熱服

塌氣散

楊氏家藏方

治小兒飲食不調腹脹緊急上氣喘促

體腫面浮

陳米

合一

青橘皮

去白半兩

肉豆蔻

二枚

甘草

一兩

黑牽牛

一分

右為末每服半錢溫米飲湯調下五歲以上服一錢

不拘時候

白朮散

楊氏家藏方

治小兒脾肺不調飲食無度腹脹喘粗

頭面手足虛浮

木香

一分

白朮

青橘皮

黑牽牛

桑白皮

各半兩

右件為細末每服半錢溫米飲下不拘時候

塌氣丸

宿州陳氏方

治小兒脾虛腹脹或疳瀉黃瘦

木香

二錢半

青皮

一兩

草撥

胡椒

各半兩

全蠍

五箇

右為極細末稠糊和丸如黃米大一歲兒服五十丸乳汁下粥湯亦可空心服候半箇時得吃乳食日進

二服量兒大小以意加減

塌氣退黃湯

東垣蘭室方

治小兒面色萎黃腹脹能食不

化

麻黃

澤瀉

各二分

白朮

黃連

各半兩

杏仁

柴胡

根

青皮

各半錢

桂枝

吳茱萸

厚朴

草豆蔻

麴末 升麻根 羌活 蒼朮 白茯苓 猪

苓 橘皮 黃蘗

各一分

右都作一服水一盞煎法如常食前服

三聖丸

宿州陳氏方

治小兒腹脹足冷或腹中氣响而足冷

或水瀉而足冷或虛渴而足冷或冀青而足冷或頭
顱溫而足冷或脉沉重而足冷

石亭脂

一兩如臘色者研

黑附子

七錢重者炮去皮臍取半兩

右為細末飯糊為丸如黍米大週歲兒每服十五丸

乳汁送下肚飢時服一時後可與乳吃量兒大小加減學中家傳必用屢效

惺惺丸治百日内腹脹

青木香 青皮

去白各一錢

巴豆

三七粒炒

胡椒

七粒

蠅梢

三七

條

右為末淡醋煮糊為丸如麻子大每服三四丸熟水吞下如未退再用保童丸一二服取效或疝氣兩腎大小偏墜腫痛啼叫不乳一方無青皮有縮砂以硃砂

為衣如胸膈疼痛煨薑湯下如血氣痛炒薑醋湯下
如肺氣盛白礬蛤粉各三分黃丹一分研為末煎桑
白皮糯米飲下如腎氣脇下痛茴香酒吞下大便不
通蜜水吞下如氣噎水香湯下宿食不消陳皮湯下
或諸熱膀胱熱脇下痛不可治此藥最能除之昔有
人病項筋痛諸醫皆以風治之數月不瘥乃流入背
脊又注在脇亦痛苦甚乃合服之一服即愈後常再
服之立效

丁奚腹大 附論

夫小兒丁奚病者由乳食過度而脾胃尚弱不能磨消故也哺食不消則水穀之精減損無以榮其氣血致肌肉消瘠其病腹大頸小黃瘦是也久不瘥則變成穀癥傷飽名哺露病一名丁奚三種大體相似輕重立名也小兒丁奚謂之鼓槌鶴膝候凡小兒或因吐而瀉久不瘥或病退不能行膝大腸紅號曰丁奚七歲以下號鼓槌風十五以下名鶴膝風蓋此是風冷傷於腎所致

腎主骨故也小兒腹大如有青筋見即曰疳肚也如無青筋乃名丁奚是因過飽傷食而得之

方

十金丹治丁奚哺露由脾胃久虛不能傳化水穀以榮血氣致骨肉消瘦腎氣不足復為風冷所傷使榮骨枯露亦有胎中受毒而成此疾

青皮 陳皮 五靈脂 莪朮 川芎 白豆蔻
仁 檳榔 木香 蘆薈 史君子肉 蝦蟇

三稜

煨

縮砂仁

各五錢

丁香

二錢

香附子

炒去毛三錢

右為末以神麴末調猪膽九米湯下

大鷄骨丸治小兒丁奚骨中微熱腹內不調食不為肌

膚或寒熱腹大

雄鷄骨

一具炙

赤芍藥

半兩

赤茯苓

半兩兩錢

石膏

細研水飛

過

川大黃

紫苑

洗去苗土各半兩

陳橘皮

湯浸去白

甗嬰孺

白礬

燒灰

細辛

洗去苗土

附子

炮裂去皮臍各半兩

黃芩

去黑

心

甜葶藶

隔紙炒令香各三分

桂心

三分嬰孺用二分

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日

三服更量兒大小以意加減

人參丸

幼幼新書

治小兒傷食失衣當風濕冷水浴腹大丁

奚時下利寒熱如瘧不欲飲食雖食不充肌肉又不
能消化羸瘦不一

人參 麥門冬

焙去心

半夏

湯浸十遍去滑

黃耆

剉

大黃

剉炒

苦參 礬石

燒汁盪研

甘草

炙

遠志

去心

黃芩

去黑心各三分

硝

石 研 芳窮

各半兩

右為末煉蜜和九如麻子大一二歲每服三九米飲
下四五歲五九早晚各服一次量兒大小加減

麝香紫霜九

幼幼新書

治小兒新生客忤所中驚癇發熱哺

乳不消中風掣縮跟口吐舌卒注面青目上揺腹滿
丁奚羸瘦脰交三歲不能行

麝香

研

牛黃

研

雄黃

研

丹砂

研各一兩

黃連

去 桂

去粗皮

烏賊魚骨

各半兩

特生礬石

煉成者一分

赤足蜈蚣

半枚炙

附子

炮裂去皮臍各一兩

巴豆

二十枚去皮心絹袋貯灰汁煮半日別搗如泥

右為末煉蜜和成劑密器盛勿令泄氣每服旋丸兒
生十日至三十日服如黍米大二九乳汁下四十日
至百日服如麻子大三九米飲下一歲至三歲以意
增之兒雖小而宿食甚者亦當增丸數

鼈甲丸

幼幼新書

治小兒羸瘦不生肌肉食飲不多腹大面

目萎黃不長主治百病

鼈甲

炙

桂心

各三分

大黃

五分

人參

前胡

茯苓

乾地黄

芍藥

乾薑

各三分

黃芩

一分

廣蟲

十箇炙

右為末蜜丸小豆大三九日進三服量與之佳

史君子丸

新書 幼幼

治小兒腹大羸瘦疳氣脹

史君子

一兩

木香

胡黃連

麝香

研

盧薈

研各

半兩蟾

頭

一枚炙令焦

墨

研

青黛

研

雄黃

研

熊膽

研各

半兩

右為末蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下十九量兒

大小加減

撮瘡丸

新書 幼幼

治小兒堅瘡面黃羸瘦丁奚不欲食肌膚

枯澁心中懵懵煩悶或更時發寒熱五臟虛脹腹中

疼痛常若下痢

蜀漆

七分

細辛

六分

龍膽

五分

乾薑

二分

附子

四分

丹皮

蜚蠊

或作廣蟲
非黃蟲

蝟頭

酒浸
炙黃

曾青

無曾青空
青代之

桂心

各三

分

右為末蜜丸梧桐子大飲下二九日進三服以知為度忌猪魚生菜等物

大麝香丹

幼幼
新書

治小兒羸瘦腹大見青筋及丁奚等病

麝香

粉霜

各研

硃砂

細研
水飛

白礬

灰各
半兩

五靈脂

肉

豆蔻仁

乾蟾

塗酥炙各一兩

乾地龍

炒一分

夜明砂

乾

蜣螂

七箇去翅炙令黃熟

右為末與硃砂等同研勻細煉蜜和丸如黍米大每

服三粒至五粒溫水下量兒大小加減

十金丹

醫方大成

治丁奚哺露不調傷於脾胃

檳榔

生用

枳殼

去瓢炒

青皮

去白

陳皮

去白

三稜

炒

蓬朮

炒

縮砂仁

各半兩

丁香

一分

木香

炮

香附子

炒一兩

右為末以神麴末打糊為丸如黍米大空心食前米

湯下一百九

黃連九

聖濟總錄

治小兒堅痞面黃羸瘦丁奚不充肌肉心

中躁悶時發寒熱五臟虛脹腹中疝痛

蜀漆

細辛

去苗

龍膽

附子

炮裂去皮臍各半兩

乾薑

炮

牡

丹皮

黃蟲

微炒

桂

去粗皮

曾青

研各三分

右為末煉蜜和丸如菉豆大空心五九米飲下量兒

大小加減服之

代赭九

切切新書

治小兒丁奚癥癖黃瘦髮脫

代赭研細 川大黃

劉微炒

硃砂

細研水飛過各半兩

巴豆霜

半分

鼈甲

半兩塗酥炙令黃去裙襴用

杏仁

木香

知母

各一分

右為末同研令勻煉蜜為丸如麻子大每服以粥飲

下二九更量兒大小加減服之日一兩服以瘡利為

度

麝香丸

出聖惠方

治小兒丁奚肚大青筋不生肌肉四肢乾

瘦頭大髮稀

麝香研細 肉豆蔻

去殼乾蟾塗酥炙令黃

夜明砂

地龍

並微

炒各
一分 硃砂 細研水飛

五靈脂 半兩

白礬 一分

蜚螋 三枚

去翅足
炙令熟

右為末研令勻煉蜜和丸如菉豆大每日空心以溫水下五丸晚再服量兒大小以意加減

麝香丸治小兒內疳身體壯熱毛髮焦乾常有淚口瘡
脚手細弱腹脇鼓脹睡好合面飲水不休

麝香 牛黃 丹砂 青黛 夜明砂 瓜蒂

熊膽

研

蟾頭

乾者湯浸去赤水焙乾

胡黃連

各半兩

右為末燒粟米飯為丸如黃米大每服一歲二九二歲已上四五九量兒大小加減溫水下

訶梨勒丸

聖濟總錄

治小兒疳瘕腹大羸瘦骨立疳氣水穀

不消

訶梨勒

去核煨三分

肉豆蔻

一枚去殼

丹砂

研

青黛

研

麝香

研

蘆薈

研各一分

熊膽

研各一分

右為末粟米飯和丸如黍米大每服七丸粥飲下日二服量兒大小加減

大黃丸

新書 幼幼

治小兒丁奚腹脹頭大頸細手脚心熱好

吃冷水皆是脉藏內疳

川大黃

一分到微炒

蛇蛻皮

三條燒灰

蟬殼

三七枝

巴豆霜

一字

鉛霜

半錢細研

乾蝦蟆

一枚塗酥炙黃

皮巾子灰

有孔子處取半錢

右為末都研令勻煉蜜和丸如菉豆大三歲兒每服

空心以漿水粥飲下三丸後以桃柳湯洗拭乾以青

衣蓋良久有蟲出為妙量兒大小以意加減服之

芍藥丸治小兒百病寒熱大腹食不消化不生肌肉痿

痺下利不止

芍藥 茯苓

雄黃

各五分

柴胡

四分

鼈甲

炙三分

桂心

二分
人參 一分一方
用二分

右為末蜜丸三歲以下服三丸如小豆大不知加之
七八歲三丸如桐子大不知加之若腹堅大者加鼈
甲一分渴者加花粉二分病甚者服二十日效一方
有杏仁二兩人參三分紫苑三分

仙人玉壺丸治小兒羸瘦丁奚不能食食不能化

雄黃

梨蘆

丹砂

礬石

巴豆

去皮膜各二兩千金方止

用各一兩八角附子

炮裂去皮臍二兩千金方却用三兩

右先搗巴豆三千杵次用礬石又搗三千杵內梨蘆三千杵次內附子三千杵次用雄黃三千杵內蜜又搗萬杵佳若不用丹砂者內真珠四兩每用藥輒搗五百杵內少蜜恐藥飛揚治藥用玉相吉日良時童子齋戒為良天晴日明無霧白晝藥成密器封之勿令泄氣置清潔器兒百病驚癇痞塞及有熱百日半

歲者以一九如黍米大調塗乳頭與服之一歲已上
如麻子一九日三以飲服小兒大腹及中熱惡毒食
物不化結成積聚服一九小兒寒熱頭痛身熱及吐
哕服一九如麻子大小兒羸瘦丁奚不能食食不化
漿水服二九日三或苦酒和如梧桐子大及傅腹上
良

芍藥丸治小兒丁奚雖食不生肌肉腹大食不能消

方見

本門嘔

露類

野鼠九治小兒丁奚肚大四肢瘦弱

野鼠

一枚去皮
臟灸今焦

乾薑

炮裂

厚朴

去粗皮塗薑
汁灸令香熟

桂心

甘草

炙各
一分

右為末以棗肉和丸如菉豆大三歲每服用生薑湯
下七九日三服量兒大小以意加減

狼毒九治腹中有熱脹滿不思飲食大小便不利及苦
腹痛癖便膿血下重丁奚腹痛脫肛脇下有痞

狼毒

二分附子

一箇

川椒

出汗

巴豆

去皮各
四分

右為末以棗子九葉萸大茶飲下一九天明及日午再服一九數服消磨下食日進三服

鉤藤飲治小兒驚疳腹大項細

鉤藤

甘草

炙

人參

瓜蒌根

各一分

右粗搗篩每用一錢水一小盞煎取五分去滓分二服空心午後溫服隨兒大小加減

無辜黃芩九治小兒疳腹大項細貪食不充肌肉黃瘁

黃芩

去黑心

黃連

去鬚各半兩

附子

炮裂去皮臍一枚半兩者

右三味搗羅為末用黃雌雞肥嫩者一隻去毛勿令
着水腹上開一小竅子取出腸肚納藥末於飯上蒸
軟即取出暴乾不用雞為末軟飯為丸如菰豆大量
丸之大小與之每至十五九二十九米飲下不計時
候日三服

二聖丸治小兒丁翼腹脹乾瘦毛髮焦黃

大蝦蟇

一枚端午日收眼赤者為佳

臭黃

二兩為末

右淨取却蝦蟇肚腸然後滿腹着臭黃末以紙裹上
以泥封令乾更加泥如此可三遍待泥乾即於大火
中燒令煙盡搗羅為末用粟米飯和丸如粟米大兒
每歲以粥飲下一丸服藥後以生熟水浴兒拭乾以
青衣覆之令睡良久有蟲出即效

塌氣丸治小兒疳氣腹大氣急不思飲食

青橘皮

不拘多少
用湯浸開

巴豆

每青橘皮一箇用巴豆一
粒使麻線繫合熱麩中炒

熟去巴
豆不用

右為末麪糊為丸如菉豆大三歲以上每服五丸或
七丸米飲下不計時候

治患疳氣大腹瘦弱

切勿
新書

搗生薤根以猪脂煎稍服之

又方

用熟炙鼠肉或伏翼肉哺之亦治哺露

六物黃芩湯治少小腹大短氣熱有進退食不安穀為
之不化

黃芩 大青 甘草 麥門冬 石膏

各半
兩
錢三

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

哺露

附論

夫哺露者因乳哺不調傷於脾胃致令脾胃衰弱漸不能食氣減損肌肉不榮而柴骨羸露其臟腑之氣不宜則吸吸苦熱謂之哺露也宜服麝香進食丸

方

大黃丸治小兒哺露脇下痞堅腹滿虛脹手足煩熱往

來無時

大黃

劉炒
二兩

乾薑

炮半
兩

人參

二兩

丹參

去蘆
頭

沙參

苦

參

防風

各一
兩

桂

去粗皮
半兩

玄參

一兩

麝蟲

炙焦
八枚

附

子

炮裂去皮
脂半兩

白朮

赤茯苓

去黑皮
各半兩

葶藶

紙上炒
半兩

杏仁

去皮尖雙
仁麤炒研

巴豆

十枚去皮膜
研出油盡

蜀椒

去目并閉
口者炒出

汗各
一分

右搗羅十五味為末與巴豆杏仁同研煉蜜九如麻

子大每服二九至三九米飲下量兒大小加減

人參九治小兒哺露失衣當風食冷水浴腹大時痢或
寒熱如瘧不欲食縱食不生肌肉或不消化四肢羸
瘦

人參

去蘆頭

麥門冬

去心

半夏

湯浸七遍去滑

黃耆

剉

川大

黃

剉微炒

白茯苓

柴胡

去苗

黃芩

以上各三分

訶梨勒

煨用

皮

甘草

炙

鼈甲

醋炙黃去裙

芎藭

半兩

右為末煉蜜和丸如麻子大一二歲兒每服以粥飲
下三九四歲五九日三服量兒大小以意加減

調中檳榔丸治小兒哺露腹脹體瘦

方見本門
積聚類

十金丹治小兒手足極細項小骨高尻削體痿腹大臍
突號哭胸陷或生穀癥是名丁奚寒熱往來頭骨分
開翻食吐蟲煩渴嘔噦是為哺露二者皆因脾胃久
虛不能消化水穀以滯氣血致肌肉消鑠腎氣不足
復為風冷所傷柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血
致之皆無辜種類之疾並難治

青皮

去

陳皮

去

白蓬朮

煨

川芎

北五靈脂

白豆

薏仁 鷄心檳榔 蘆薈 各半 木香 史君子肉

蝦蟇灰 各三錢

右為末猪膽汁浸糕糊丸如麻子大每服二十九米飲下有熱薄荷湯下

五味子湯療少小傷寒久病不除瘥復劇羸瘦骨立

五味子 十枚 大黃 六枚 芒硝 五分 麥門冬 六分 石膏 一分 甘草

草 炙 當歸 黃芩 黃連 前胡 各一分

右切以水三升煮取一升半分服二合下利即止加

減量之

雞骨丸治小兒哺露傷飽手足煩熱羸瘦不生肌肉

雞骨

煮熟黃雄雞左右肋骨一兩炙黃

赤芍藥

川大黃

劉微炒

紫

苑

洗去苗土

赤茯苓

柴胡

去苗各半兩

細辛

黃芩

桂

心

各一分

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以溫水下五九早

晨晚後各一服量兒大小加減服之一方有礬石一

分無柴胡桂心

破積丸治小兒哺露化腸胃食滯痞氣腹滿發熱

木香

一兩

青橘皮

湯浸去白
焙一兩

桂心

去粗皮
一兩

巴豆霜

炒半

錢吳茱萸

湯浸焙乾
炒三兩

礞砂

醋熬霜研細
末炒一錢七

右搗羅前四味為末與礞砂巴豆霜同拌研勻醋煮

麪糊為丸如菜豆大每服三丸加至五丸早晚食後

臨卧服大便溏為度量兒大小虛實以意加減

芍藥丸治小兒寒熱久不解仍不能食飲若食不消哺

露堅痞腹大下痢不止

芍藥

三分桂 去粗皮 半兩

柴胡

去苗 大黃 剉炒各 一兩

赤茯苓

去黑

皮

鼈甲

醋炙去泥 爛各半兩

右搗羅為末煉蜜九如麻子大一歲已下每服三九

米飲下早晨日午夜卧各一服一方桂心柴胡赤茯

苓各半兩芍藥等三味各三分蜜湯下五九丁奚腹

大食不生肌肉一方有紫苑

代赭丸治小兒哺露腹脹體瘦

代赭

研

赤石脂

丹砂

研各一分

巴豆

十粒去皮心研 紙壓去油盡

杏仁

二七粒針穿燈上
燎作聲為度用

右先別研細再合研勻爛飯丸如黍米大每服一九
乳汁或粥飲下更量兒大小加減

丹砂雙丹治少小哺露痞堅壯熱驚啼哺乳不生肌肉
食不消化下痢骨肉消瘦

丹砂 巴豆

去皮心灰汁煮
半日別研如泥

甘遂

末炒令
黃黑色

雄黃

右等分為末蜜和丸每下二九一月兒如粟米大五
十日已上黍米大日三服兒稍大即以意加之服三

日後兒大利專視之若病未盡藥必散出如病愈藥自全出者勿服轉不下者增之兒有強者加之乳母忌猪魚

鼈甲丸治小兒哺露腹堅體熱羸瘦

鼈甲

塗醋炙黃
去裙襴

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去
皮炙乾各三分

常山

羊兩

右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五九日
三服量兒大小以意加減或青白物下即愈

鼈甲散

傅氏活
嬰書

治哺露腹堅體熱瘦弱

鼈甲

鹽酒浸炙

肉蓯蓉

酒浸洗焙

陳皮

青皮

三稜

莪

朮

神麴

麥芽

白茯苓

半夏

秦艽

北

柴胡

甘草

各等分

右咬咀每服一錢生薑棗子煎服

治小兒哺露大腹者

草木

以牡鼠肉炙食之

脾胃不和

附論

夫脾者臟也胃者腑也脾胃二氣合為裏胃受穀而脾

磨之二氣平調則穀化而能食若虛實不等水穀不消故令腹脹或泄利不能飲食所以謂之脾胃氣不和不能飲食也

凡人以胃氣為本治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐不食之証實則有痞滿內熱之証虛者益之實者損之欲得其平則可矣胃虛用木香丁香厚朴肉豆蔻等劑胃實用桔梗枳殼柴胡大黃等劑若夫胃中停寒則乾薑良薑官桂丁香不可缺宜在酌量但小小分劑與之

方

七香丸治小兒消食快膈和胃止痛

木香 丁香 檀香 甘松 丁皮

各三錢

陳皮

去白

縮砂仁

各五錢

三稜

莪朮

醋煮各五錢

白豆蔻

三錢 香附

子

炒去毛 二兩

益智仁

三錢

右為末糊九湯吞下

五香散治小兒脾胃久虛吃食減少四肢羸瘦

丁香

沉香

各一兩

麝香

三錢 細研入

木香

藿香

白

朮

各一兩

訶梨勒皮

半兩

陳橘皮

浸去白焙

黃耆

各一兩

甘草

炙半兩

白茯苓

右擣篩為散以水五升慢火煎至一升以布絞取汁

却入鍋內入麝香蜜三合生薑汁半合棗肉二十枚
慢火熬成膏每服以粥飲調半茶匙量兒大小以意
加減

人參湯

一名溫脾散
出聖惠方

治小兒脾胃氣不和不能飲食脇

痛虛脹壯熱增寒困倦

人參

三分

白朮

半兩

訶梨勒皮

三分

木香

黃耆

白茯苓

苓

去黑皮

藿香葉

陳橘皮

去白瓢各半兩

甘草

炙一分

桔梗

炒半兩

右擣篩每服一錢水七分入生薑三片棗一枚煎至四分去滓不計時候量兒大小增減溫服

益智仁湯夫心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入脾胃藥中庶幾兩得古人進食方劑多用益智者此也

益智仁 石菖蒲 白茯苓 蓮子肉 陳皮

縮砂仁 半夏麴 木香 厚朴

製各二錢

甘草

炙一錢

右剉細每服一錢薑三片棗一枚水一盞煎不拘時

服

萬靈丹

幼幼新書

治小兒脾胃久不和挾積服溫熱藥皆不

效此藥神效

肉桂

川黃連

蓬朮

各一兩

檳榔

肉豆蔻

陳

橘皮

去白

木香

丁香

各半兩

巴豆

去皮心膜十四枚

杏仁

十四

枚麩炒去皮尖二物燈上燒灰存性

右同再研擣拌勻滴水和丸如黍米大每服未週歲一粒三二歲二粒三四歲三粒七歲五粒十歲以上

七粒生薑湯放冷下乳食後久積或乳癖並宜服之
前胡散治小兒脾胃不和見食欲嘔心胸壅悶

前胡

去蘆頭

蘆根

剉各三分

桂心

一分

赤茯苓

人參

去蘆頭

白朮

甘草

炙

枇杷葉

拭去毛炙微黃

厚朴

去粗皮薑汁炙各半兩

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時候看兒大小分減溫服

參香湯理嘔吐消寒痰

蘆薈

一人參

茯苓

木香

丁香

丁皮

青

皮

各半兩

甘草

炙一兩

右呔咀每服一錢水一盞薑二片煎取五分溫服

白豆蔻散治小兒脾胃不和增寒壯熱腹痛嘔吐不納

乳食

白豆蔻

去皮

陳皮

去白

芡蒬

枇杷葉

拭去毛微炙

甘草

炙各

一分乾木瓜

人參

黃耆

各半兩

右為粗散三歲小兒每服一錢水一小盞生薑錢大

三片棗一枚同煎至五分去滓溫服不計時候量兒

大小加減

益脾散和胃進乳消痰

白茯苓 人參 草薹仁 蘇子

微炒

木香

濕紙裹火內煨

甘草 陳皮 厚朴

去粗皮薑汁炒

右對散每服一錢生薑一片紅棗一枚末乳前服合
滓乳母服

調中散治小兒冷熱不調致脾胃不和

木香 人參

青皮

去白各一兩

丁香

白朮

白茯苓

苓 大腹皮 甘草

各半兩

右為末每服一錢以水一小盞生薑三片煎至五分

去滓溫服

益胃丹

一名沉香豆蔻丸 百一選方

調冷熱和脾胃

當歸

洗焙

木香

白朮

沉香

白芍藥

人參

蓬朮

砂仁

各半兩

右為細末白麪糊和丸如黍米大每服十五粒麝香

湯下量兒大小加減以治小兒乳哺失宜冷熱不調

熱衝上膈冷歸下焦致虛實不等水穀不化遂傷脾胃胃氣虛則嘔吐脾氣虛則泄痢夾積則變為下痢膿血蓋居常脾胃最宜調適也廬州郭用方

集香散

醫方妙選

治脾胃虛冷不欲食羸瘦

丁香

沉香

木香

藿香葉

厚朴

薑汁製各一兩

白朮

白茯苓

白豆蔻

各一兩

右為末入麝香一錢拌勻以水一升蜜半觔大棗三十枚生薑二十片銀器中慢火熬成膏生薑棗不用

風處吹乾如皂子大乳前米飲化下

丁香黃耆散治小兒脾胃虛弱不能飲食已漸傷損榮衛致令肌體羸瘦時時下痢面色青白宜用

丁香

綿黃耆

人參

去蘆頭

白朮

當歸

焙

鼈甲

醋炙黃
各一兩

胡黃連

甘草

各半
兩

右搗羅為細末每服一錢水一盞生薑二片棗二枚同煎至五分去滓食前溫服

訶梨勒散治小兒脾胃不和時時腹脇虛脹不欲乳食

訶梨勒皮

桂心

乾薑

炮

甘草

炙各一分

荊三稜

煨

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去粗皮薑汁炙各半兩

右搗細羅為散不計時候以溫棗湯調下半錢量兒

大小以意加減

勻氣散

桔梗

甘草

縮砂

益智子

茴香

藿香葉

各等分

右為末每服半錢水瀉紫蘇木瓜煎湯下脾胃不和

生薑棗子湯下

木香散治小兒調中順氣補虛

草豆蔻

五箇和皮用

人參

茯苓

防風

藿香

各半兩

陳橘皮

去白一分

右為末每服一字或半錢薑鹽米飲下

白朮散

如宜方

理脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯

竭多躁但欲飲水乳食不進羸困不治變成風癰不

問陰陽虛實並宜服之

一名錢氏白朮散

乾葛

二人參

白朮

茯苓

去皮

甘草

炙

藿香

木

香

各一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎取半盞去滓溫服不拘
時候渴甚者併煎任意飲常服加山藥心神不定加
辰砂酸棗仁渴加乾葛木瓜胃冷加丁香砂仁嘔吐
加藿香薑汁吐瀉加扁豆陳皮藿香豆蔻痰嗽加杏
仁桑白皮半夏麴邪熱加前胡薄荷黃芩渴加天花
粉乾葛盜汗加陳麥大便滑加訶子天花粉細辛桔

梗各等分薄荷薑煎

開胃九

十便良方

治小兒臟腑怯弱內受風冷腹脇脹滿腸

鳴泄痢或青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹

痛

木香

蓬莪茂

當歸

炒

白朮

人參

各半兩

麝香

細研白芍藥

各一兩

右為末研勻湯浸炊餅為丸如黍米大每服十五丸
米飲下又一法煉蜜丸每兩作五十丸每服一九米

飲化下不拘時候

枳殼湯寬中進食

枳殼

去熟炒

青皮

去熟炒

木香

丁香

當歸

縮砂仁

陳皮

去白等分

右為細末燒鹽湯調下

六味人參湯

出聖惠方

治小兒脾胃氣不和腹脇妨悶不能

飲食四肢羸瘦

人參

甘草

炙

丁香

黃耆

到各一分

陳橘皮

湯浸去白焙

訶梨勒皮

各半兩

右粗搗篩每服一錢水七分入生薑二片棗一枚煎至四分去滓食前溫服量兒大小以意加減

乾地黄九治小兒脾胃氣不和不嗜飲食不生肌肉

生乾地黄

焙

大黃

剉炒香

當歸

炙

柴胡

去苗

杏仁

湯浸去皮

尖雙仁麩炒各半兩

白茯苓

去黑皮一分

右為末煉蜜和丸如麻子大每服五丸生薑湯下日三服隨兒大小以意加減不拘時

高良薑湯治小兒傷冷脾胃氣不和腹痛不欲飲食

高良薑

陳橘皮

湯浸去白焙

草豆蔻

去皮當歸

剉微炒

桂

去粗皮
各一分人參半兩

右粗搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓不計時
候量兒大小分減溫服一方無人參

阿膠散溫脾胃正氣理泄瀉胃熱煩渴不問陰陽虛
實並宜服之或乳食不進羸困少力因而失治變成
風癰服白朮散蘇葉梗煎正脾生薑棗虛實熱服涼

藥後不能食先用此生胃中津液後又服生犀散退
早涼夜熱不可下只用煎三升許頓服稍愈後再服
三升候不渴無涎又投此藥二服即安白水煎亦可
如渴飲水多者多服無時盜汗虛汗亦用此藥止瀉
治痰退熱清神渴倍加白朮渴甚者任意多飲之

阿膠

一兩半
麩炒

鼠粘子

一分
炒

馬兜鈴

半兩

甘草

一分

杏仁

七箇去
皮光

糯米

一兩

右為散每服二錢用水煎服

六神湯理脾胃虛止吐瀉進飲食養氣

嫩黃耆 白扁豆炒 人參 白朮 白茯苓 粉

草

各等分或加
藿香葉亦可

右為末每服二錢蘇葉湯下止風生薑棗子湯調下

醒脾散

人參 白朮 豆蔻 甘草 乾薑 藿香各等分

右為末每服一錢或半錢薑湯下如醒脾胃冬瓜子

仁米飲下

消食丸溫中快膈

香附子

炒二兩

縮砂仁

一兩

陳皮

去白

甘草

神麴

炒麥

藥

炒各半兩

右為末泡雪糕丸如黍米大七歲已上菴豆大三十

丸食後薑湯下或作末子用百沸湯入鹽點尤佳

人參丸治小兒乳哺飲冷過度傷於脾胃胸脇脹滿多

吐涎痰

方見本門食不消類

當歸丸治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛或腹中

氣滿或時嘔逆不欲乳食

白芍藥 當歸炒 人參 芳藟各三分 白朮 甘草

炙各
半兩

右為末水煮麴糊丸如麻子大三歲小兒每服十九
粥飲下日三服更量大小加減

桂朴散溫脾胃

肉桂一兩 厚朴製 白朮 乾薑各半兩 甘草炙一分

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

陳橘皮湯治小兒脾胃氣弱乳食不消化

陳橘皮

湯浸去白焙

高良薑

人參

各一分

白茯苓

去黑皮半

兩

甘草

炙半兩

右粗篩一二歲每服一錢水七分煎至三分去滓食前溫服至晚三服隨兒大小加減

和中湯治小兒脾胃虛冷吐痢不思飲食

人參

一兩半

白朮

白茯苓

去黑皮各一兩

甘草

炙

厚朴

去粗

皮生薑汁
炙各三分

右粗搗篩三四歲兒每服一錢水半盞同煎至三分
去滓服日夜可三服量兒大小以意加減

史君子丸正脾助胃

厚朴

去粗皮
薑汁炙

陳皮

甘草

史君子

去殼
別研

訶子

去核

各等

分

右為末煉蜜丸如菉豆大每服三七丸疳瀉積瀉米
飲下熱瀉加青黛米飲下冷瀉薑中暑瀉香薷時行瀉
桑葉赤痢藍姑草白痢烏梅驚瀉藍姑草已上並用

米飲下

藍姑草竹葉菜是也

益黃散治小兒脾胃虛弱吐瀉又治脾疳腹大身瘦此藥補脾調氣治冷腹痛久冷泄效

陳皮 青皮 訶子 甘草

各一兩

丁香

五錢

右剉散每服二錢水一盞生薑二片煎空心服一方為末每一歲兒服一字二歲服一錢百沸湯調下日進二服忌一切生硬冷物

人參膏治嬰兒飲乳自不知飢飽全在乳母存節若見

兒啼哭定後乳母乃可令兒飲乳若啼哭未定氣未調使兒急飲乳即兒氣逆乳不得下反致嘔逆甚則吐利成胃虛病應一切脾胃不和並宜服之

人參

一兩

白朮

丁香

藿香葉

各半兩

白豆蔻

一分

右為末煉蜜和成膏如雞頭實大每服一粒至二粒乳前米飲化下

四君子湯隨證加味量兒大小用

人參

白朮

茯苓

甘草

各等分

右為末服二錢傷寒加麻黃豆豉北柴胡吐瀉南木
香藿香乾葛潮熱牛黃鬱金朴硝全蠍薄荷麻豆牛
蒡子紫草蟬蛻荆芥腹膨枳殼木通蘇子薑片冷瀉
稗豆豆蔻薑片棗子咳逆肉豆蔻木通大熱苦竹瀝
積熱上攻茅根淡竹葉甘草乳食不下訶子木香時
行咳嗽藿香枳殼薑片暴風燥痒荆芥牛蒡子枳殼
高良薑蟬蛻鼻流清涕羌活麻黃防風泄瀉肉豆蔻
木香滑腸訶子榴皮臟毒形如白痢或有血根如魚

腦髓豆蔻地榆枳殼赤痢粟殼烏梅白痢粟殼白薑
大便秘利大黃朴硝小便不利木通車前子霍亂木
瓜藿香葉腹痛茴香附子或用澤瀉郁李仁薑棗或
只用木瓜豆蔻腹緊積候三稜檳榔薑湯下有淋火
麻子仁生熟皆可車前子海金沙葶藶子下溺血生
地黃瞿麥渴枇杷葉炙去毛瓜根咳杏仁炒去皮尖
貝母知母薑片蘇子夜睡驚啼茯苓酸棗仁驚邪薄
荷硃砂犀角人參顛癇甘草硃砂茯苓牛黃乳香犀

角人參鉛白霜喉痺犀角杏仁當歸豆豉百合大黃
口瘡雞內金腦子黃芩朴硝苦竹葉唾血生地黃當
歸藕節側柏人參蒲黃血衄山梔子淡竹葉目赤秦
皮菊花苦竹葉甘草肚蟲檳榔史君子枳殼苦楝皮
頭昏石膏川芎癥瘕及腹中氣塊肚痛此氣疾世用
天雄三稜朴硝大黃五心熱犀角腦子磨刀水下氣
不升降沉香蘇子養氣肥兒檳榔木香紫蘇葉紅棗
白朮湯治小兒脾胃氣虛乳食不消腹脹

白朮 人參

厚朴

去粗皮薑汁炙各一分

右粗搗篩一二歲兒每服一錢水半盞煎至三分去滓溫服至晚三服隨兒大小以意加減

橘皮湯治小兒脾胃虛冷氣逆不能飲食

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去粗皮各一兩

右剉碎分作三貼每用一貼以水三盞入薤白五莖細切黍米一合同煮稀粥熟去藥分二服

治小兒胃寒蟲上諸危惡與癇相似

肘後方

乾漆

炒煙盡

白蕪荑

各等分

右為細末米飲調下一字至一錢

治大人小兒不進乳食和氣去痰

人參

四兩半夏一兩

右用生薑汁熬一宿曝乾為末麪糊丸如菉豆大每服十九食後生薑湯下

安胃和脾散治小兒脾胃不和中脘氣痞心腹脹滿全不思食食後嘔吐痰噎逆氣吞酸面色萎黃肌肉消

瘦腹脇刺痛泄瀉不止便利不調少力嗜卧胃虛弱
飲食不化並宜服之此藥仙方世間老幼氣弱俱可
常服

淨蒼朮

二兩用生薑二兩切作片子同搗爛炒黃色

厚朴

去粗皮同前製

小棗

子

二十四箇去核培乾

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

廣茂

煨對

青皮

去白

木

香

藿香葉

人參

去蘆

澤瀉

縮砂仁

檳榔

甘草

炙對

陳皮

去白各一兩

右為細末每服一二錢煎生薑湯調下日進二服忌

一切生硬冷物一方無木香

透關丸治小兒脾胃挾傷中滿硬氣及治伏熱生涎霍亂嘔吐或作食癰手足搐搦不省人事並宜服之

大蒜

端午日取出膜淨用百瓣細切搗爛

硃砂

一分細研水飛

蠟梢

三十五條去毒

微炒為末

細松煙墨

一兩火煨過研末

巴豆

一十粒去殼出油研

右同入瓷罐子內密封掛通風處百日取出丸如黍米大每服一二丸至五十丸新汲水送下不拘時候香橘丸治小兒脾胃挾傷心腹脹滿胸膈不快硬氣喘

粗小便不利常服寬中快膈消化乳食食後臨卧服

青橘皮

去白

肉豆蔻

各二兩

黑牽牛

木香

剉各半兩

右將青橘皮炒黃次下肉豆蔻牽牛木香略同炒轉色為細末煮麪糊為丸如黍米大週歲兒每服十九乳食空心薑湯下

丁香麪藥丸治小兒脾胃怯弱乳食遲化胸滿腹脹胃冷蟲作常服開胃口化宿冷消停滯美飲食

丁香

二錢半

神麪

炒黃

麥蘖

炒

乾薑

炮

陳橘皮

去白各半兩

烏梅

去核
一兩

檳榔

二兩

右為細末煮麪糊丸如黍米大每服一十九溫米飲送下不拘時候

癖化丹治脾胃不和或因驚多啼結成癖積脇下疼痛

三稜

煨

莪朮

煨

乾漆

炒令
煙盡

木香

青黛

好墨

各一

錢

右為末煮糊為丸每服二十九米飲下

四君子湯治小兒脾胃虛弱補五臟生津液調氣血進

飲食解虛煩益肌體功效不可具錄

治久吐胃寒加蓮肉木香黃耆生薑棗子煎服 治
嘔逆噦不止加白扁豆薏苡仁並炒藿香同煎生薑
自然汁調服 治胸膈煩躁冷熱不調痰涎咳嗽不
思飲食日夜壯熱加知母貝母烏梅乾薑葱蜜炙桑
白皮同煎服之 治胎肚痛加陳皮青皮生薑同煎
服之 治夜間啼哭煩躁腹肚疼痛加陳皮木香硃
砂鉤藤同煎服之 治表裏虛弱時氣作熱欲傳疹

痘加細辛桔梗瓜蒌生薑葱白煎服 治脾寒胃熱

陰陽不順溫熱常作加滑石陳皮煎服之 霍亂吐

瀉神不安穩加藿香丁香木瓜生薑同煎熬喫 治

脾胃虛弱飲食不進加厚朴陳皮等分薑片棗子同

煎服之 治吐食不納穀氣加丁香半夏生薑向東

陳壁土同煎服之 治脾胃久虛不納飲食吐瀉不

止加肉豆蔻青皮天台烏藥木瓜生薑煎服 治虛

中熱瀉米穀不分加瞿麥車前子煎服 治虛熱煩

躁安神定志加犀角川芎燈心煎服 治心氣不足

神情恍惚加石菖蒲石蓮肉石膏麥門冬煎服 治

虛煩體熱夜啼加白附子全蠍膩粉燈心銀環煎服

治脾虛神困肌肉消瘦面色萎黃食不化腸胃

久寒吐逆無時加黑附子枳殼吳茱萸麥芽細辛生

薑棗子煎服 治霍亂吐逆腸鳴自利腹脇疼痛加

白薑陳皮同煎服 治虛中傷寒身熱疼痛煩渴加

硃砂羌活防風天麻薄荷銀環同煎 治脾虛不利

腸肚疔痛加陳皮訶子陳米同煎方見前

長壽散治小兒脾胃虛弱常服強壯去寒熱

天麻

蜜炙

甘草

炙

半夏

洗

人參

白扁豆

炒

糯米

炒

薏苡仁

各半錢

木香

一錢

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至半盞服之

治小兒脾胃虛弱臟腑滑泄日漸羸瘦

丁香

白朮

甘草

肉豆蔻

麩裏煨各等分

右為細末每服一錢一歲兒米飲調下乳食前服

助胃膏治小兒脾胃虛弱胸腹脹滿飲食少進臟腑不
調嘔吐惡心肢體倦怠

白朮 人參 厚朴 藿香 當歸 茯苓 芩

藟 青橘皮 甘草 陳橘皮 神麴 麥蘖

各半
肉豆蔻 丁香 各一分

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一九至二九生

薑湯下食前服大人亦可服

又方

人參 白朮 甘草 茴香 烏梅肉 白豆蔻

仁

各半兩

檀香

錢一

乾山藥

乾木瓜

各一兩

右為末煉蜜為丸如皂子大空心每服一九嚼服或

溫水吞下

養胃散養胃氣快胸膈定噦逆止嘔吐美飲食

丁香 藿香葉 陳橘皮 白豆蔻仁 縮砂仁

各等分

右為細末每服半錢生薑棗湯下乳食空時服

丁香平胃丸治小兒氣虛寒氣逆上行胸膈不快吐逆
不定腹脹短氣中滿痞悶

丁香 木香 藿香葉 沉香 附子 枇杷葉

水銀

硫黃

同水銀結
砂各一分

肉豆蔻

五枚

肉桂

半兩

右為細末煉蜜為丸每服一兩作四十丸每服一丸
乳食前生薑棗湯化下

溫胃丸治小兒胃虛氣逆乾噦惡心胸膈痞滿嘔吐乳

食

丁香 肉豆蔻 錢各二 木香 人參 蓮子心 薏

苡仁 炒黃各一錢半

右為細末煮神麴糊為丸如黍米大每服二十九溫
熱水送下乳食空心服

豆蔻香連丸治小兒乳食所傷脾胃怯弱冷熱不調泄
瀉嘔吐並宜服之

黃連 木香 訶子 去核半兩 丁香 錢二 肉豆蔻 半兩麴裏煨熟

去麩

不用

右為末粟米飯搜和為丸如黃米大每服三十四丸
空心食前溫米飲湯送下隨乳汁下亦可日進二服
治小兒胃寒

木香

白朮

丁香

錢各四

右剉碎作一服水半盞入燈心一把煎五七沸去滓
分兩次服

溫脾散涎者脾之液脾胃虛冷故涎自流不能收約而

漬於頤間也法當用溫脾

半夏麴

丁香

木香

各半兩

乾薑

炮二錢半

白朮

炒白

茯苓

人參

粉草

各半兩炙

右為末米飲調服局方理中丸亦妙一方用東行牛

尾拭其口涎

張浚方名溫脾丹與上散同去人參

茯苓甘草加青皮或陳皮二錢半糊丸如黍米大

木香散能和表裏通行津液

木香

大腹皮

官桂

前胡

陳皮

丁香

訶子 人參 半夏 赤茯苓 甘草 縮砂仁

各三錢

右為麤散每服三錢水一大盞生薑二片煎至六分
稍熱空心服量兒大小以意增減

替針九治因冷傷脾心腹痛脇肋疼硬不思乳食臟腑
不調

青皮 陳皮 荆三稜 枳殼 厚朴 訶子

白豆蔻

各一兩

肉豆蔻

檳榔

各半兩

乾薑

三分

右為細末水煮麪糊丸如麻子大生薑橘皮湯下二
十九食前服

四君子丸治小兒脾虛受食不化停積中脘吐逆惡
心臟腑泄瀉常服消化食滯進飲食厚腸胃充肌體
悅顏色退黃疸

縮砂仁 烏梅肉

焙乾

陳橘皮

訶子肉

各一兩

右為末煮好大棗取肉為丸如麻子大每服三十九
至五十九棗湯熟水送下不拘時服

玉桂枝丸治小兒飲食減少臟腑不調

厚朴 藿香 陳橘皮 神麴 訶子皮 各二錢 川

芎 丁香 木香 白朮 甘草 各一錢 人參 三錢

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一九生薑湯下
食前服小兒一九分二服米飲化下

羸瘦 附論

夫小兒羸瘦不生肌肉者皆為脾胃不和不能飲食即
血氣衰弱不能榮於肌膚也凡小兒在胎而遇寒冷或

生出時挾伏熱皆令兒不能飲食故羸瘦也挾熱者身體壯熱肌肉微黃挾冷者時時下痢脣口青色也

方

秦艽丸治小兒羸瘦體熱心神煩悶小便赤黃

秦艽

去苗

桑根白皮

剉

枳殼

麩炒去瓢

地骨皮

黃耆

剉

人參

去蘆頭

赤茯苓

犀角

屑

甘草

炙各半兩

龍膽

去蘆頭

柴胡

去苗三分

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候用粥飲下五

九更量兒大小增減

訶梨勒散治小兒羸瘦脾胃氣弱挾於宿食四肢不和

訶梨勒皮

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

甘草

炙各半兩

黃耆剉人

參

去蘆頭

白朮

藿香

桂心

白茯苓

各一分

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入生薑少許棗一枚煎至五分去滓溫服日三四服量兒大小以意加減

丁香散治小兒羸瘦脾胃虛冷四肢不和不欲乳食

丁香 桂心 白朮 高良薑 甘草 炙微赤各一分

白茯苓

厚朴

去粗皮薑汁炙黃

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

人參

去蘆頭

半兩

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞入棗一枚煎至五分去滓量兒大小分減溫服日三四服

黃耆九治小兒羸瘦體熱面色萎黃不欲乳食

黃耆

剉

赤芍藥

人參

去蘆頭

胡黃連

甘草

炙微赤剉

各半

麥門冬

去心焙

鼈甲

醋炙微黃去裙襴各一兩

柴胡

去苗三分

右為末煉蜜和丸如麻子大不計時候以粥飲下五
九量兒大小以意加減

麥門冬丸治小兒雖食不長肌膚羸瘦骨熱小便赤黃

麥門冬

一兩去心焙

人參

去蘆頭

黃耆

剉

青蒿子

黃連

去鬚桑根白皮

剉

枳殼

麩炒去瓢

地骨皮

各半兩

柴胡

三分去苗

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以熟水化五
九服量兒大小以意加減

燒黃瓜丸治小兒羸瘦體熱食少

黃瓜

大者一枚

黃連

去鬚

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

胡黃連

柴

鼈甲

童子小便浸三宿炙黃去裙襴各一兩

右搗細羅為散以黃瓜切開頭去瓢內藥末令滿切蓋子蓋之用蕎麥麪和溶固濟可厚三分於糖灰火內燒令麪焦黃為度取出麪放冷入麝香一錢都研和丸如菉豆大每服食前米飲下七丸更量兒大小以意加減

甘草丸治小兒羸瘦氣懨懨宜常服不妨乳

用甘草二兩炙微赤剉搗羅為末煉蜜和丸如菜豆
大每服以溫水下五九日二服量兒大小加減服之

治小兒勝瘦并疳疾

本草

黃色狀如蝦蟆調治同蛤煮食之

治癆子瘦損

用蘆薈子煎服

普濟方卷三百九十三